

Postępowanie na wypadek nieoczekiwanych trudności w intubacji tchawicy

N
A
T
L
E
N
I
A
J

W PRZYPADKU TRUDNOŚCI - WEZWIJ POMOC

PLAN A

Intubacja dotchawicza
(maksymalnie 3+1 próby)

Zgłoś niepowodzenie intubacji

Potwierdź gotowość zestawu eFONA do natychmiastowego użycia

PLAN B

Urządzenie nadgłośniowe
(maksymalnie 3 próby)

Zgłoś niepowodzenie wentylacji przy
użyciu urządzeń nadgłośniowych

Otwórz zestaw eFONA

PLAN C

Ostateczna próba wentylacji
z użyciem maski twarzowej

Zgłoś: intubacja i oksygenacja niemożliwe

PLAN D

Ratunkowy dostęp do dróg
oddechowych przez szyję (eFONA)

SUKCES

Potwierdź
wentylację
za pomocą
kapnografii

**ZATRZYMAJ SIĘ, OCEŃ SYTUACJĘ,
POINFORMUJ ZESPÓŁ**

Rozważ:

- Wybudzenie pacjenta
- Intubacja dotchawicza przez urządzenie nadgłośniowe
- Kontynuacja bez intubacji
- Dostęp do dróg oddechowych przez szyję (tracheostomia lub konikotomia)

**ZATRZYMAJ SIĘ, OCEŃ SYTUACJĘ,
POINFORMUJ ZESPÓŁ**

Rozważ w porozumieniu z lekarzem prowadzącym:

- Odwrócenie blokady nerwowo-mięśniowej i wybudzenie pacjenta
- Dostęp do dróg oddechowych przez szyję (tracheostomia lub konikotomia)